

# Asiatische Geissblätter



## Henrys/Japanisches Geissblatt

*Lonicera henryi* und *Lonicera japonica*

Herkunft: China und Japan

## Wichtig

- Weitergabe verboten (Inverkehrbringungsverbot)
- Pflanzen entfernen und durch einheimische Arten ersetzen
- Pflanze schwach giftig

## Bekämpfung

- junge Pflanzen mit Wurzeln ausreissen
- ältere, kletternde Bestände bodennah abschneiden und Pflanzen hängend trocknen lassen
- flächige Bestände halbjährlich mähen, schneiden oder mulchen

## Entsorgung

- alle Pflanzenteile im Kehricht entsorgen, professionell kompostieren oder thermophil vergären
- wildes Deponieren verboten

## Ausbreitung und Vermehrung

- Ausbreitung durch Früchte sowie Spross- und Wurzelstücke
- ungewollte Ausbreitung durch wildes Deponieren von Pflanzenmaterial
- unkontrollierte Ausbreitung der Früchte bzw. der Samen durch Vögel
- unbewusste Verbreitung der Wurzeln und Sprossstücke mit Aushub

## Kalender

|                                            |                                                                                                    |            |      |           |     |            |     |     |     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|-----|------------|-----|-----|-----|
| Blütezeit                                  | April                                                                                              | Mai        | Juni | Juli      | Aug | Sept       | Okt | Nov | Dez |
| Samenreife                                 | April                                                                                              | Mai        | Juni | Juli      | Aug | Sept       | Okt | Nov | Dez |
| Bekämpfungszeitraum                        | April                                                                                              | Mai        | Juni | Juli      | Aug | Sept       | Okt | Nov | Dez |
| ausgraben                                  | ganze Pflanzen mit Wurzeln ausreissen oder ausgraben                                               |            |      |           |     | Sept       | Okt | Nov | Dez |
| schneiden                                  | bodennah abschneiden, hängen lassen                                                                |            |      |           | Aug | Sept       | Okt | Nov | Dez |
| mähen                                      | April                                                                                              | 1. Schnitt |      | Juni/Juli | Aug | 2. Schnitt |     | Nov | Dez |
| mulchen                                    | April                                                                                              | 1. Mulchen |      | Juni/Juli | Aug | 2. Mulchen |     | Nov | Dez |
| Entsorgung Pflanzen ohne Früchte / Wurzeln | hängende Pflanzenteile vor Ort austrocknen lassen, lange Sprossstücke zusammentragen und entsorgen |            |      |           |     |            |     |     |     |
| Entsorgung Pflanzen mit Früchten / Wurzeln | Früchte und Wurzeln mit dem Kehricht entsorgen oder thermophil vergären                            |            |      |           |     |            |     |     |     |

## Erkennungsmerkmale

### Wuchs

bis 10 m hohe, teilweise immergrüne Schlingpflanze, bildet auch im Unterholz dichte Bestände

### Stängel

verholzt, kletternd oder über Boden kriechend



Blüte Henrys Geissblatt



Blüte Japanisches Geissblatt

### Blüte (Juni bis August)

Henrys Geissblatt: 1.5 bis 2.5 cm lang, gelb bis orangerot oder rosa, Blüten zu zweit miteinander verwachsen

Japanisches Geissblatt: stark duftend, 3 bis 4 cm lang, erst weiss mit rosa, später gelb, Blüten zu zweit miteinander verwachsen



Beeren Henrys und Japanisches Geissblatt

### Frucht (September bis November)

Henrys Geissblatt: Früchte blauschwarz

Japanisches Geissblatt: Früchte schwarz




### Blätter

länglich, nicht verwachsen, gegenständig , oben dunkelgrün, unten heller  
Henrys Geissblatt: 3 bis 12 cm lang, fester  
Japanisches Geissblatt: 3 bis 6 cm lang, weicher

### Standorte

in Gärten kultiviert, verwildert in Wäldern, Hecken, an Waldrändern, Ufern und in Gebüsch

### Verwechslungsgefahr



Frucht und Blätter Garten-Geissblatt

Frucht Wald-Geissblatt

Garten-Geissblatt (*Lonicera caprifolium*): gebietsfremd, orange bis leuchtend rote Früchte, oberstes Blattpaar miteinander verwachsen

Wald-Geissblatt (*Lonicera periclymenum*): einheimisch, blaugrüne Blattunterseite, wohlriechende Blüten in quirligen, endständigen Blütenständen, dunkelrote Früchte